

POTASSIUM-U preservative free

acu pilieni, šķīdums, bez konservantiem

1. Kas ir POTASSIUM-U preservative free, un kādā nolūkā to lieto

POTASSIUM-U preservative free ir izotonisks acu šķīdums skalošanai, kurā kā palīgviela ietilpst kālija jodīds. Tas ir paredzēts pilināšanai acī. Palīgviela kālija jodīds acī darbojas kā skābekļa brīvo radikāļu saistītājs. Šīs kālija jodīda īpašības izmanto eksudāta (uzkrājiens audu šķidrums) un hemorāģijas acī novēršanai un atbalstošai ārstēšanai.

Bez konsultēšanās ar oftalmologu to var izmantot vienkāršai acs skalošanai, iepilnot acī vai izmantojot kā kompresi plakstiņiem. Produktu izmanto acs skalošanai kā atbalstošu vielu noteiktos atbalstošos resorbcijas procesos (jo īpaši eksudātiem, stiklveida ķermeņa asiņošanai un dažādas izcelsmes kataraktai) acī.

Produktu POTASSIUM-U preservative free var izmantot pieaugušie, pusaudži un bērni.

POTASSIUM-U preservative free nesatur konservantus, tādēļ tas ir lieliski piemērots personām ar jutīgām acīm.

2. Kas jāzina, pirms lietot POTASSIUM-U preservative free

Nelietojiet POTASSIUM-U preservative free, ja jums ir alerģija pret kādu no preparāta sastāvdaļām (skatīt 6. sadaļu).

POTASSIUM-U preservative free acu pilienus nedrīkst lietot arī šādos gadījumos:

- grūtniecība un laktācija
- hroniska sejas ādas piodermija
- hemorāģiska diatēze
- pacienti ar traucētu vairogdziedzera darbību
- jaundzimušie

Ja šobrīd lietojat citus acu līdzekļus, ieteicams nogaidīt vismaz 5 minūtes starp preparātu lietošanas reizēm.

3. Kā lietot POTASSIUM-U preservative free

Ārsts nosaka precīzu preparāta devu un lietošanas ilgumu. Parasti acs konjunktīvas maisīnā iepilina 1-2 pilienus 2-4 reizes dienā.

Brīdinājums


Uzreiz pēc produkta iepilināšanas var īslaicīgi rasties neskaidra redze. Šādā gadījumā nedrīkst vadīt transportlīdzekļus, lietot mašīnas un jānogaida, līdz redze atgūst asumu.

Kontaktlēcu valkātājiem

Ja valkājat kontaktlēcas, tās ir jāizņem, pirms lietojat POTASSIUM-U preservative free. Pēc POTASSIUM-U preservative free lietošanas jānogaida 20 minūtes, iekams ievietoja kontaktlēcas atpakaļ.

Lietošanas pamācība

1. Nomazgājiet rokas un ērti apsēdieties vai stāviet kājās.
2. Atskrūvējiet pudeles vāciņu.




3. Turiet pudeli lejup starp īkšķi un pārējiem pirkstiem.
4. Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams uzpildīt pirmo pili ārpus acs, viegli spiežot pudeli, jo, spēcīgi un nevienmērīgi spiežot pudeli, šķīdums var izšļākties lielākā apjomā.
5. Izmantojiet pirkstu, lai uzmanīgi pavilktu lejup attiecīgās acs apakšējo plakstiņu.




6. Novietojiet pilināšanas uzgali tuvu acij, taču tā, lai tas nepieskartos blakus acij esošajiem apvidiem.

7. Viegli saspiediet pudeli tā, lai 1 pile nonāktu acī. Tad atlaidiet apakšējo plakstiņu un lēnām aizveriet aci, lai POTASSIUM-U preservative free vienmērīgi izplatītos pa acs virsmu.

Nemiet vērā, ka var paiet dažas sekundes, līdz pile pēc pudeles saspiešanas iztek no pudeles. Pudeli nedrīkst saspiest pārāk stipri.



8. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru otrai acij.



9. Pēc lietošanas pudeli vienreiz jāpakrata lejupvērstā virzienā, nepieskaroties pilināšanas uzgalim, lai no uzgaļa nokratītu šķidruma pārpalikumus. Tā jārikojas, lai garantētu acu pilienu sterilitāti un vienkāršāku nākamās piles izspiešanu nākamajā lietošanas reizē.

10. Tūlīt pēc iepilināšanas cieši noslēdziet pudeles vāciņu.

4. Kādas ir iespējamās blakusparādības

Parasti produktam POTASSIUM-U preservative free ir laba panesamība. Tūlīt pēc iepilināšanas var rasties viegli dedzinoša sajūta.

Pēc nekontrolētas ilgstošas izmantošanas (pārāk lielā devā) jutīgiem pacientiem var rasties tā sauktais "jodisms". Tā izpaužas kā konjunktīvas kairinājums un piepildīšanās ar asinīm, pastiprināta asarošana, kā rezultātā rodas plakstiņu tūska (Kvinkes tūska) un asaru dziedzeru dziedera tūska; uz ādas var rasties eritēma, akne, dermatīts un asins izplūdumi.

Ja rodas kāda no minētajām blakusparādībām vai citas neparastas reakcijas, informējiet par to ārstējošo ārstu.

5. Kāds ir POTASSIUM-U preservative free saturs

Nātrija hlorīds 2 mg uz 1 ml, kālija jodīds, nātrija tiosulfāts, dinātrija edetāts, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.

6. Kā uzglabāt POTASSIUM-U preservative free, un cita informācija

Uzglabājiet pudeli oriģinālajā iepakojumā līdz 25°C temperatūrā. Neatdzesēt/nesasaldēt.

Uzglabāt preparātu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārtidža marķējuma vai kastes blakus smilšu pulksteņa ikonai. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet POTASSIUM-U preservative free, kad ir pagājušas 12 nedēļas kopš pudeles pirmās atvēršanas. Pēc POTASSIUM-U preservative free produkta iepilināšanas uzreiz ir jāaizver vāciņš.

Iepakojuma izmērs: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava,
Slovākijas Republika

Tālr.: +421 2 4333 3786

Fakss: +421 2 4363 8743

E-pasts: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



2265



Šī lietošanas pamācība pēdējo reizi aktualizēta 2021. gada martā