

SeptoZINC

Nātrija hlorīds 7,5 mg/ml
Acu pilieni, šķīdums

1. Kas ir SeptoZINC, un kādā nolūkā to lieto

SeptoZINC produkts ir sterils izotonisks skalošanas šķīdums ar antiseptiskas un sinerģiskas iedarbības vielu piedevām (cinka glukonāts un benzalkonija hlorīds). Paredzēts pilināšanai acīs un acu skalošanai.

Cinka glukonātam un benzalkonija hlorīdam ir dezinficējoša (antibakteriāla un antivīrusu) iedarbība uz aci. Šīs vielu kombinācijas īpašības izmanto, lai novērstu acu infekcijas un atbalstītu to ārstēšanu.

Labvēlīgās antibakteriālās īpašības, kas piemīt cinka jonu saturošiem savienojumiem, jau izsenis ir zināmas un lietotas oftalmiskos preparātos. Cinks glukonāta formā veido aizsargslāni uz konjunktīvas gļotādas virsmas, zem kura var notikt šūnu reģenerācija, kas veicina acs konjunktīvas maisiņa fizioloģiskā stāvokļa atjaunošanos.

Benzalkonija hlorīda antiseptiskā iedarbība balstās uz tā virsmaktīvajām īpašībām. Pateicoties mitrinošajām, izkļiedējošajām un emulsējošajām īpašībām, netīrumus, tostarp mikroorganismus, aizskalo no acs virsmas. Benzalkonija hlorīda antiseptiskā iedarbība balstās arī uz tā antibakteriālajām un antivīrusu īpašībām.

2. Kas jāzina, pirms lietojat SeptoZINC

Nelietojiet SeptoZINC, ja jums ir alerģija pret kādu šā produkta sastāvdaļu.

SeptoZINC produktu var lietot pieaugušie, pusaudži un bērni, kas vecāki par 1 gadu.

Ja vienlaikus tiek lietoti citi acu pilieni vai ziedes, tās var lietot arī ne agrāk kā pēc 5 minūtēm kopš SeptoZINC produkta lietošanas.

3. Kā lietot SeptoZINC

Bez konsultēšanās ar oftalmologu to var lietot pilināšanai un/vai vienkāršai īslaicīgai acs skalošanai.

Deva:

Lai nomierinātu acis un papildinātu konjunktīvas un skropstu infekciju ārstēšanu, iepilināt 1 pili apakšējā konjunktīvas maisiņā 3 reizes dienā.

Uzklāšanas garums ir individuāls.

Brīdinājumi pirms lietošanas

Pēc atvēršanas SeptoZINC produkts ir gatavs lietošanai acīs. Pacients atskrūvē drošības vāciņu, nedaudz pagāž galvu uz atpakaļ, apgriez pudelīti lejup un, saspiežot plastmasas pudelīti, iepilina noteiktu piliņu skaitu apakšējā konjunktīvas maisiņā. Izmantotais šķīduma daudzums ir atkarīgs no lietošanas veida. Iepiliniet vai izskalojiet ietekmēto aci ar šķīdumu pēc vajadzības (izspiesto šķīduma daudzumu var kontrolēt, saspiežot pudeli). Izpilināšanas laikā uzgalim nevajadzētu pieskarties acij, plakstiņam vai skropstām. Visbeidzot, vāciņš ir cieši jāaizskrūvē, lai novērstu iespējamu piesārņošanu. Pudele jāuzglabā vertikāli.

Brīdinājumi:

Pacientiem, kam ir sausās acs sindroms un citas acs virsmas slimības, ir jāievēro piesardzība. Nav ieteicams lietot ilgāk par 14 dienām bez pārtraukuma, ja jums ir šis sindroms.

Ja simptomi, kuru novēršanai produkts tiek lietots, neuzlabojas un saglabājas ilgāk par divām dienām vai pat pasliktinās, konsultējieties ar oftalmologu.

SeptoZINC produkts neietekmē koncentrēšanos, ja nepieciešama pastiprināta uzmanība, piemēram, vadot transportlīdzekļus, ekspluatējot iekārtas un strādājot augstumā. Taču pēc iepilināšanas konjunktīvas maisiņā reizēm īslaicīgi var rasties neskaidra redze; tādēļ darbības, kam nepieciešama pastiprināta uzmanība, var veikt tikai pēc tam, kad ir beidzies šis īslaicīgais efekts. Ja bērns nejauši ir norijis izstrādājumu, sazinieties ar ārstu.

Produkta iepilināšanas laikā pacientam acīs nedrīkst būt mīkstās kontaktlēcas (jo īpaši hidrofilās). Ja iespējams, procedūras laikā nevalkāt arī cietās kontaktlēcas, un pirms produkta lietošanas pacientam vienmēr ir

jāizņem tās ārā, bet atpakaļ var likt ne agrāk kā 20 minūtes pēc produkta lietošanas.

4. Iespējamās blakusparādības

SeptoZINC produkta panesamība ir ļoti laba. Retos gadījumos uzreiz pēc lietošanas var rasties īslaicīga viegla dedzināšanas sajūta. Tāpat var rasties hipersensitivitātes reakcija.

Ja jums rodas šīs blakusparādības vai cita neparasta reakcija, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Mijiedarbības: Nav ziņots.

5. Kāds ir SeptoZINC saturs

Nātrijs hlorīds 7,5 mg 1 ml

Palīgvielas: benzalkonija hlorīds 0,2 mg uz 1 mL (0,02) cinka glukonāts, kālija hlorīds, magnija hlorīda heksahidrāts, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrijs citrāts, aqua purificata (attīrīts ūdens).

6. Kā uzglabāt SeptoZINC un cita informācija

Uzglabāt produktu līdz 25°C grādu temperatūrā. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārtidža marķējuma vai kastes blakus smilšu pulksteņa ikonai. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

Pēc atvēršanas iepakojums jāizlieto 28 dienu laikā.

Iepakojuma izmērs: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovākijas Republika

Tālr.: +421 2 4333 3786

Fakss: +421 2 4363 8743

E-pasts: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



2265



Pēdējās pārskatīšanas datums: 2021. gada marts